


DISTRIBUCIÓ



TARJA D'IDENTITAT

CABIROL (*Capreolus capreolus*)

CLASSE: Mamífers

ORDRE: Artiodactils

FAMÍLIA: Cervíds

PES: Mascle: 16-35 kg

Femella: 15-30 kg

LONGITUD: 95-135 cm

ALÇADA A LA CREU: 60-80 cm

CUA: 2-4 cm

HÀBITAT: Boscos de plana i muntanya amb claranes; garrigues, prats i camps cultivats

LONGEVITAT: 8-15 anys

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Amb risc mínim.



EL CABIROL: Presentació

- El cabirol és el més petit dels cervíds europeus que viuen en llibertat. La seva silueta esvelta, les seves potes fines, les seves llargues orelles i la seva cua quasi inexistent el fan fàcilment identificable.
- El pelatge dels adults és marró rogenc durant l'estiu i grisós durant l'hivern. Com tots els cervíds, tenen escut anal a la part posterior. Les cries tenen un pelatge marró vermellós tacat de blanc, molt característic. Només el mascle té banyam i perd les banyes cada any entre octubre i novembre.
- La reproducció dels cabirols és única entre els cervíds. La brama es produeix a l'estiu: juliol-agost, però la gestació no comença fins el desembre. La gestació diferida permet que les cries neixin en una època més favorable, a mitjans de maig o a principis de juny.
- Es troba en expansió a Catalunya gràcies a les reintroduccions i es concentra per tota la serralada pirinenca i per masses forestals de la resta de Catalunya



EL CORZO: Presentación

- El corzo es el más pequeño de los cervíds Europeos que viven en libertad. Su silueta esbelta, sus finas patas, sus largas orejas y su cola casi inexistente hacen al corzo fácilmente identificable.
- El pelaje de los adultos es marrón rojizo durante el verano y grisáceo durante el invierno. Como todos los cervíds, tienen escudo anal en la parte posterior. Los corzinos tienen un pelaje marrón rojizo manchado de blanco, muy característico. Tan solo el macho tiene cornamenta y pierde las astas cada año entre octubre y noviembre.
- La reproducción de los corzos es única entre los cervíds. La brama se produce en verano: Julio-agosto, pero la gestación no comienza hasta diciembre. La gestación diferida permite que los corzinos nazcan en una época más favorable, a mediados de mayo o a principios de junio.
- Está en expansión en toda Cataluña gracias a las reintroducciones y se concentra por toda la sierra pirenaica y por masas forestales del resto de Cataluña.

LE CHEVREUIL: Présentation

- Le chevreuil est le plus petit cervidé vivant à l'état sauvage en Europe. Avec sa silhouette gracieuse, ses pattes fines, ses longues oreilles et sa queue presque invisible, le chevreuil se reconnaît assez facilement.
- Les adultes ont un pelage brun-roux en été et gris-brun en hiver. Les deux sexes portent, sur le fessier, une tache claire appelée "miroir". Les femelles ont une livrée brun-rougeâtre tachetée de blanc, très caractéristique. Seul le mâle porte une ramure dont les bois tombent chaque année en octobre-novembre.
- La reproduction du chevreuil est unique chez les cervidés. L'accouplement a lieu en plein été: juillet-août, mais la gestation ne commence pas avant décembre. Cette gestation différée permet aux faons de naître à une époque plus favorable, vers mi-mai ou début juin.
- Il est en expansion dans toute la Catalogne grâce aux reintroductions et il se concentre par toute la montagne pyrénéenne et par masses forestales du reste de la Catalogne.

Elegant i discret